

MANEJO EN URGENCIAS PACIENTES CON COVID-19



Equipo de protección individual

- El **personal sanitario** que atienda a casos de infección por SARS-CoV-2 o las **personas que entren en la habitación de aislamiento** (p. ej familiares, personal de limpieza...) **deben llevar un equipo de protección individual** para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya **bata, mascarilla (quirúrgica o FFP2)** según el tipo de procedimiento a realizar y siempre asegurando las existencias suficientes para las situaciones en las que su uso esté expresamente indicado), **guantes** y **protección ocular**.
- Los **procedimientos** que generen **aerosoles** se deben realizar únicamente si se consideran estrictamente necesarios para el manejo clínico del caso. Estos incluyen procedimientos como la **intubación traqueal**, el **lavado bronco-alveolar**, o la **ventilación manual**, se deberá reducir al mínimo el número de personas en la habitación y todos deberán llevar:
 - Una **mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3** si hay disponibilidad.
 - **Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo.**
 - **Guantes.**
 - **Batas de manga larga** (si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un **delantal de plástico**).

MANEJO EN URGENCIAS PACIENTES CON COVID-19



Traslado del paciente en la urgencia extrahospitalaria

- El transporte del paciente se realizará en una **ambulancia con la cabina del conductor físicamente separada del área de transporte del paciente**. El **personal** que intervenga en el transporte (salvo el conductor, si no sale de la cabina) deberá ser informado previamente y deberá **utilizar el equipo para la prevención de la infección** por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto.
- El **paciente** deberá llevar colocada una **mascarilla quirúrgica**.
- Se recomienda que el paciente vaya **sin acompañantes** en la ambulancia. En el supuesto de que sea imprescindible que el paciente esté acompañado (dependiente, menor u otra circunstancia) el **acompañante** necesitará una **mascarilla quirúrgica**.
- Una vez **finalizado el transporte** se procederá a la **desinfección** del vehículo con los productos habituales y a la **gestión de residuos** de acuerdo con el procedimiento habitual.